

Colza :

* Maladie :

- **Aucun symptôme signalé**

* Ravageurs : **retour de l'activité des ravageurs**

- **Altises des crucifères et grosses altises d'hiver:**

De nombreuses morsures sont signalées sur l'ouest audois

- **Charançons du bourgeon terminal :**

Piégeages important sur un site dans l'ouest Audois, une grande vigilance est à observer

- **Limaces : Peu à pas dégâts sont signalés sur la zone**

- **Présence très localisée de tenthrede de la rave (Montpellier)**

* Adventices : Levées très importantes de repousses de céréales et de ray grass.


Climat :

Les pluies de la semaine dernière, accompagnées par des températures douces, permettent un bon développement des colzas sur le Languedoc Roussillon.

Ces températures douces sur la zone L.R sont favorables à l'activité des insectes.

Les bassins de production suivis :

Uniquement l'ouest Audois



Colza

L'analyse de risque est effectuée sur la période du 11 octobre 2010 au 25 octobre 2010
Le réseau comprend 9 parcelles de référence, l'analyse est effectuée sur les 4 parcelles renseignées
durant cette période situées dans l'ouest audois

Stades phénologiques

Les colzas sont entre le stade B2 et B5
Il est à noter une hétérogénéité des stades du colza au sein d'une même parcelle.

Altises des crucifères (Petites Altises) et grosses altises d'hiver

Dégâts sur feuilles : les parcelles au stade cotylédon sont les plus sensibles

Des morsures sur cotylédons sont notées sur l'ouest Audois avec en moyenne 8 plantes sur 10 Touchées.

Le seuil de nuisibilité est atteint

Les captures dans les cuvettes jaunes sont des grosses altises d'hiver (jusqu'à 38 insectes par piège), les vols continuent...

Rappel

Période de risque : de la levée au stade 3 feuilles

Seuil d'alerte : 3 pieds sur 10 avec des morsures

Le seuil de nuisibilité : 8 plantes sur 10 présentant des morsures

Il faut surveiller les parcelles n'ayant pas encore atteint 3 feuilles à 4 feuilles **.La vigilance est de mise pour les parcelles semées fin septembre qui sont en cours de levée**

NB

En cas de destruction partielle de cotylédons (altises, limaces) la culture n'est pas compromise si le cœur n'est pas atteint, la plante est capable de récupérer.

Charançons du bourgeon terminal

Des captures sont de nouveau signalées sur tous les sites (de 4 à 13 insectes piégés).

Période de risque : du développement des premières larves jusqu'au décolllement du bourgeon terminal.

La lutte étant impossible contre les larves, c'est l'arrivée des adultes qui déclenche le début de la période à risque

Seuil de nuisibilité : il n'y a pas de seuil de risque pour le CBT. Sa nuisibilité potentielle étant forte, il est considéré que la seule présence d'insecte sur la parcelle est un risque

Il est important de bien surveiller l'évolution des captures de cet insecte durant les prochains jours

Limaces

Les lits de semences pailleux sont favorables à l'activité des limaces **en conditions humides**.
Les dégâts dus à ce ravageur sont très importants.

RAPPELS :

Période de risque : de la germination au stade 3-4 feuilles

Seuil de nuisibilité : a surveiller dès la levée : premiers dégâts sur feuille

Les pluies de ces derniers jours sont favorables à l'activité des limaces : surveillez vos parcelles

Tenthrède de la rave

Présence signalée de larves sur la zone sud de Montpellier : 2 à 5 larves par plante.

Le seuil d'alerte est dépassé

Les dégâts sur feuilles sont de l'ordre de 40 à 50% de la surface foliaire détruite.

Le seuil de nuisibilité est atteint.

Rappel : surveillez les colzas et utilisez la cuvette jaune

Ravageurs d'automne :

Limaces : surveillez de la levée jusqu'au stade 3-4 feuilles



[Photo dégât de limace]



Altises : détectez l'arrivée des grosses altises en utilisant la cuvette jaune en position



enterrée (voir schéma)

[Photo dégât petite altise]

Tenthrède de la rave : observez la présence de dégâts et de larves sur les colzas entre 3 et 8 feuilles.



[Photo dégât tenthrède]]

- Observez la présence de morsures circulaires sur les cotylédons et les premières feuilles depuis la levée jusqu'au stade 3 feuilles.

Publication de la Chambre Régionale d'agriculture du Languedoc-Roussillon

Directeur de publication : Guy GIVA

Rédacteur en chef : Myriam GASPARD

Comité de rédaction : Philippe BRAUN (Arvalis), Gilles BEUGNIET (CETIOM), Gilles TERRES & Jean-Michel GILLOT (CA11), Alain ALLIES (CA34), Thierry PIANETTI (CA30), Alain FAURE (SRAL).

Rédigé en collaboration avec : Chambres d'Agriculture du Languedoc-Roussillon, Ets VIDAL Appro Services,

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. LA CRA-LR dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs et les invite à prendre leurs décisions sur la base d'observations qu'ils auront eux mêmes réalisés sur leurs parcelles et/ou en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins d'information technique.