

QUÉSACO? Reconnaître les symptômes des maladies et ravageurs de l'abricotier

Cette fiche a pour but de faciliter la reconnaissance des maladies et ravageurs de l'abricotier en s'appuyant sur des photos. Elle n'a pas vocation à être exhaustive mais peut guider les observations en verger.

Le tableau ci-dessous liste des bioagresseurs rencontrés dans le verger, dont la fréquence est variable selon les conditions de l'année et l'itinéraire de culture. Les bioagresseurs indiqués en gras sont

les plus régulièrement observés ; les autres sont moins fréquents, ou peuvent être liés au mode de conduite. Les pages suivantes présentent des photos de symptômes selon l'organe concerné


(branche, pousse, feuille, fruit...). Sont également exposés d'autres symptômes, non liés à des bioagresseurs, mais pouvant être confondus.

Périodes d'observation du symptôme et organe concerné en fonction du bioagresseur

maladie ravageur bois feuille ou pousse fleur fruit

Bioagresseur \ mois	janv.	fév.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
<i>Travaux au verger</i>	taille d'hiver			éclaircissage manuel	récoltes				taille			
Enroulement chlorotique de l'Abricotier												
Psylle vecteur de l'ECA		Environnement parcelle										
Moniliose des fleurs et rameaux												
Cécidomyie des fleurs												
Bactériose à Pseudomonas												
Campagnol provençal												
Cloque												
Tordeuse des buissons												
Tavelure												
Péritèle												
Petite mineuse Anarsia												
Forficule												
Capnode												
Oïdium												
Coryneum												
Escargot, limace												
Plomb parasitaire												
Sharka												
Bactériose à Xanthomonas												
Moniliose des fruits Maladies de conservation												
Punaise diabolique												
Puceron farineux												
Tordeuse orientale												
Cicadelle verte												
Cératite												
Rouille												

Symptômes sur bois (collet, charpentière, branche)



ENROULEMENT CHLOROTIQUE DE L'ABRICOTIER : *CACOPSYLLA PRUNI*, VECTEUR DE L'ECA



printemps - été

BACTÉRIOSE *PSEUDOMONAS SYRINGAE*



Ce symptôme de dépérissement de l'arbre peut être imputable à la fois à la bactériose *Pseudomonas*, au capnode, au campagnol provençal ou, si l'arbre entier dépérit, à une asphyxie racinaire.



printemps - automne

CAMPAGNOL PROVENÇAL



printemps - été

CAPNODE

Symptômes sur fleur, rameau, feuille et pousse



MONILIOSE DES FLEURS ET RAMEAUX



de mars à mai



de fin mars à début mai

CLOQUE



de fin mars à début mai

TORDEUSE DES BUISSONS



février - mars

CÉCIDOMYIE DES FLEURS



avril


CHARANÇON DU FEUILLAGE (PÉRITÈLE)

Symptômes sur feuille



juin - juillet

BACTÉRIOSE XANTHOMONAS ARBORICOLA PV PRUNI



printemps-été

BACTÉRIOSE PSEUDOMONAS SYRINGAE



printemps-été

CRIBLURE À CORYNEUM



ROUILLE DU PRUNIER



de juillet à septembre


Symptômes sur feuille et pousse

maladie ravageur



CICADELLE VERTE

été



printemps-été

PETITE MINEUSE ANARSIA



CAPNODE DE L'ABRICOTIER

été



PUCERON FARINEUX

été



PLOMB PARASITAIRE

de mai à juillet

Symptômes sur fruits



de mi-avril à août

OÏDIUM



de mi-avril à août

CORYNEUM



de mi-avril à août

BACTÉRIOSE PSEUDOMONAS



de mai à août

BACTÉRIOSE XANTHOMONAS



de mi-avril à août

BOISAGE (FROTTEMENTS DUS AU VENT)



de juin à août

TAVELURE



Dégât et larve d'anarsia



Larve de tordeuse orientale



Larve d'anarsia

de juin à août



de juin à août

PETITE MINEUSE ANARSIA - TORDEUSE ORIENTALE DU PÊCHER

MONILIOSE DES FRUITS



avril-mai




de mai à juillet

ESCARGOT OU LIMACE

FORFICULE



d'avril à août



de juin à août

GRÊLE

CÉRATITE

Symptômes sur fruits

maladie ravageur autres



COUP DE SOLEIL - ÉCHAUDURE

mai-juin



GEL



avril



SHARKA

de juin à août



PUNAISE DIABOLIQUE



de mai à août

CREDITS PHOTOGRAPHIQUES : CHAMBRES D'AGRICULTURE DU GARD, DE L'HERAULT, DES PYRENEES-ORIENTALES, GRCEITA DE BASSE-DURANCE, INRAE, SUD EXPE.