



Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto

A retenir



Abonnez vous aux éditions Midi-Pyrénées du BSV

www.bsv.mp.chambagri.fr

ESPECES à PEPINS	<u>Tavelure</u> : Risques de repiquages en présence de taches. <u>Tordeuses de la pelure</u> : A surveiller. Période d'éclosions en cours. <u>Carpocapse</u> : Période d'intensification des éclosions jusqu'au 1 ^{er} juillet.
POMMIER	<u>Puceron cendré</u> : Nombreux repiquages en bout de pousses. Nombreux auxiliaires et régulation naturelle en cours <u>Puceron lanigère</u> : A surveiller. <u>Oïdium</u> : Risque de repiquage en vergers contaminés. <u>Monilia</u> : Nombreux symptômes observés.
POIRIER	<u>Psylles</u> : Période d'éclosions en cours.
KIWI	<u>PSA</u> : Les conditions climatiques restent favorables à la bactérie.
PRUNIER	<u>Pucerons verts</u> : Période de risque en cours. Pression maîtrisée en verger. <u>Carpocapse</u> : Fin de la période à haut risque d'éclosion de la G1.
PECHER	<u>Pucerons verts</u> : Période de risque en cours. Pression « normale ».
CERISIER	<u>Drosophila suzukii</u> : Risque fort en cours (stade sensible sur les précoces + fort inoculum). Dégâts forts sur les parcelles non traitées, mais pression contenue en parcelles traitées.
TOUTES ESPECES	<u>TOP</u> : Intensification des éclosions de la G2 à partir du 20 juin jusqu'au 28 juin. <u>Lécánines</u> : Début de l'essaimage en parcelle. Début du risque fort. Surveiller la sortie des larves à la parcelle. <u>Pou de San José</u> : Fin du 1 ^{er} essaimage <u>Monilia</u> : Période de risque en cours sur cerisier et sur les variétés précoces de pêcher et de prunier japonais.

ESPECES À PÉPINS

• Tavelure (*Venturia inaequalis*)

x **Suivis biologiques** : Sur nos dispositifs de suivis biologiques, les projections sont maintenant très faibles ou terminées.

- 0 spore sur le site CEFEL du 6 au 13 juin (sur un total de 514 à 552 spores à ce jour),
- 3 spores sur le site FREDON du 6 au 13 juin (pour un total de 242 spores à ce jour).

Directeur de publication :

Denis CARETIER
Président de la Chambre Régionale d'Agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées
BP 22107 - 31321 CASTANET TOLOSAN Cx
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution
ISSN en cours

x Données de la modélisation :

Selon les modèle DGAL et RimPro, avec les paramétrages utilisés, la maturation et la projection des ascospores serait terminée depuis la fin du mois de mai.

x Situation dans les parcelle : Les taches issues des dernières contaminations primaires (fin mai-début juin) devraient être visibles actuellement.

Évaluation du risque : Le risque est maintenant lié aux risques de repiquages dans les vergers avec présence de taches. Bien contrôler l'état sanitaire des parcelles.

• Tordeuse de la pelure Capua (*Adoxophyes orana*)

Sur notre réseau de piégeage, le premier vol est maintenant terminé. Nous n'observons pas, dans nos parcelles de surveillance, de larves de tordeuses de la pelure.

Évaluation du risque : Fin de la période du premier vol. Surveiller la présence de larves.

Seuil de nuisibilité : 5% de bouquets atteints

• Carpocapse des pommes (*Cydia pomonella* L.)

Le carpocapse des pommes et des poires hiverne au stade larve diapausante, dans un cocon, sous les écorces ou dans le sol. Les adultes de 1^{ère} génération émergent généralement peu après la floraison des pommiers et les femelles pondent sur les feuilles ou les jeunes fruits. La durée entre la ponte et l'éclosion est d'environ 90° jours en base 10.

Sur notre réseau de surveillance le vol de carpocapse a réellement démarré entre le 2 et le 9 mai.

x Données de la modélisation : Les modèles ont été initialisés au 5 mai 2016

Selon le modèle DGAL, nous serions actuellement à 74% du vol, à 63% des pontes et à 41% des éclosions. Le pic de ponte devrait durer jusqu'au 25 juin. Le pic d'éclosions devraient durer jusqu'au 3 juillet (secteur Montauban).

Selon le modèle INRA, nous serions actuellement à 73% du vol, à 47% des pontes et à 21% des éclosions. Le pic de ponte devrait durer jusqu'au 25 juin. Le pic d'éclosions devraient durer jusqu'au 2 juillet (secteur Montauban).

Évaluation du risque : Période d'intensification des pontes et des éclosions en cours.

Seuil de nuisibilité : plus de 5 piégeages par semaine
(les pièges ne fonctionnent pas en secteur confusé)

• Cécidomyie des feuilles (*Dasineura mali*, *Dasineura pyri*)

Les cécidomyies des feuilles sont de petites mouches qui pondent dans les feuilles encore enroulées. Les larves (asticots), par leur salive, provoquent un gonflement de la feuille qui reste enroulée. Au terme de leur développement (15 jours en moyenne), les larves se laissent tomber au sol pour se nymphoser. 3 à 5 générations peuvent se succéder dans la saison.

Sur notre réseau de surveillance, nous observons une reprise des piégeages depuis le 1^{er} ou le 6 juin selon les parcelles. Ces piégeages restent modérés par rapport aux deux années antérieures.

Nous observons également quelques symptômes (enroulements), mais beaucoup moins que les années précédentes à pareille époque.

Évaluation du risque : Second vol en cours.

• Feu bactérien (*Erwinia amylovora*) : On n'observe pas ou très peu de symptômes actuellement.

Évaluation du risque : Fin de la période de forte sensibilité

POMMIER

• Puceron cendré (*Disaphis plantaginea*)

On observe de nombreux « repiquages » (colonies de virginipares) de puceron cendré sur jeunes feuilles. On observe également de nombreux insectes auxiliaires dans les foyers (larves de syrphes, larves et adultes de coccinelles...). Dans de nombreuses situations, la plupart des foyers sont régulés par les insectes auxiliaires.

Évaluation du risque : Fin de la période de fort risque (peu de risque sur fruit actuellement); à surveiller ;

■ **Seuils de nuisibilité :** Puceron cendré : foyers évolutifs

• Puceron vert (*Aphis pomi*)

On observe des foyers de puceron vert migrant à l'extrémité des pousses. On observe également de nombreux insectes auxiliaires dans les foyers (larves de syrphes, larves et adultes de coccinelles...).

Évaluation du risque : Le risque en verger adulte est essentiellement lié à la fumagine sur fruits se développant sur le miellat.

■ **Seuils de nuisibilité :** Puceron vert : fumagine sur fruit

• Puceron lanigère (*Eriosoma lanigerum*)

On observe également, depuis mi-avril, une reprise d'activité du puceron lanigère. La migration sur bois de un an est maintenant généralisée. Les niveaux de populations sont très variables selon les parcelles. Le vol d'*Aphelinus* se poursuit à un niveau relativement faible.

Évaluation du risque : A surveiller

■ **Seuils de nuisibilité :** Puceron lanigère : présence de fumagine sur fruits

• Punaises

On observe de nombreux dégâts en vergers, notamment sur les variétés Gala et Pink.

• Oïdium (*Podosphaera leucotrichia*)

On observe des pousses oïdiées (drapeaux) sur des parcelles fortement contaminées l'an passé. On observe également des repiquages sur jeunes feuilles.

Évaluation du risque : Période de sensibilité en cours.

① **Mesures prophylactiques :** La suppression des drapeaux (pousses oïdiées) permet de limiter l'inoculum primaire.

• Monilioses (*Monilia laxa*)

Le *Monilia* se conserve dans les fruits momifiés et dans les chancre sur rameaux. Les conidies sont transportées par le vent et la pluie toute l'année. Elles germent en présence d'eau et de blessures (grêle...). On peut observer des dégâts sur fleurs, rameaux et fruits. Certaines variétés sont particulièrement sensibles (Ex : Granny Smith, Juliet...).

On observe des dégâts sur un nombre relativement important de parcelles (Juliet, Granny, Braeburn, Chantecler...). D'après les analyses réalisées, il s'agit de *Monilia laxa*.

Évaluation du risque : Fin de la période de sensibilité du végétal.

① **Mesures prophylactiques :** La suppression des rameaux contaminés permet de réduire l'inoculum (les conidies se conservent sur les chancres sur rameaux); tailler les rameaux les plus atteints et les mettre au sol.

- **Black rot** (*Sphaeropsis malorum*)

Des conditions chaudes (>24°C) et humides entre la floraison et le stade petit fruit sont favorables aux contaminations primaires. Les variétés les plus sensibles sont Chanteclerc, Fuji et Gala.

Évaluation du risque : Les conditions de la semaine en cours pourraient être favorables à l'activité du champignon. A surveiller.

- **Colletotrichum**

Le Colletotrichum est un champignon responsable de l'antracnose sur différentes espèces. Sur pommier, il provoque des ponctuations noirâtres qui évoluent plus ou moins rapidement en pourritures circulaires avec des fructifications roses-orangées caractéristiques. Les contaminations semblent possibles à partir de conidies de la nouaison à la récolte lors de périodes humides. L'inoculum se maintient au verger sur les bourgeons, les momies... .

Nous observons des dégâts sur un certain nombre de parcelles depuis 2 ans, et plus particulièrement l'an passé suite aux pluies du mois d'août. Les variétés les plus souvent touchées en 2015 étaient Granny, mais aussi Golden et Pink. L'inoculum présent dans la parcelle semble très important dans l'épidémiologie de la maladie.

Évaluation du risque : Il existe un risque de contamination dans les parcelles atteintes en 2015. A surveiller.

POIRIER

- **Psylles** (*Psylla pyri*) : Nous observons les premières éclosions depuis le 15 mai et elles se poursuivent.

Évaluation du risque : Période d'éclosion en cours. A surveiller.

KIWI

- **Stades phénologiques :** Floraison

- **PSA** (*Pseudomonas syringae actinidiae*)

Les conditions climatiques du printemps ont été favorables au développement de la bactérie. Les conditions climatiques sur la floraison sont également favorables aux contaminations. On observe des symptômes sur fleurs (nécrose sur sépales) sur un certain nombre de parcelles, ainsi que des symptômes sur feuilles.

Évaluation du risque : Les conditions climatiques restent favorables à l'activité de la bactérie.

Éléments de biologie :

Cette bactériose est en recrudescence dans le verger régional depuis trois ans. Elle se développe très rapidement sur kiwi jaunes et sur les variétés précoces, entraînant des mortalités de branches, d'arbres voire de parcelles entières. La variété Hayward est moins sensible, mais on peut y observer des dégâts, sur plants mâles surtout mais également sur certaines plantations.

La présence de la bactériose se manifeste par écoulements blanchâtres et ou rougeâtres sur les charpentières ou les troncs.

PRUNIER

- **Puceron vert** (*Brachycaudus helichrysi*)

En parcelles traitées la pression est globalement bien maîtrisée désormais mais on observe quelques nouveaux foyers. Des larves de syrphes, des adultes de coccinelles et des œufs de chrysopes sont régulièrement observés.

Évaluation du risque : La période de risque est en cours sur pruniers japonais et variétés domestiques. Il n'y a un risque désormais que si les foyers sont évolutifs. A surveiller.

- **Carpocapse des prunes** (*Cydia funebrana*)

Le premier vol est sur la fin, les captures sont faibles depuis le début et diminuent encore.

Le modèle indique à ce jour 77% des éclosions. Les éclosions de la G2 devraient démarrer autour du 26 juin et s'intensifier autour du 3 juillet.

Nous observons quelques dégâts en vergers bio mais pas en vergers conventionnels.

Évaluation du risque : Fin de la période à haut risque d'éclosions en cours. Les conditions climatiques sont moins favorables sur la G1 qu'en 2015.

A condition de transmettre régulièrement les résultats de vos relevés de piégeage dans le cadre du réseau de surveillance biologique du territoire, la Chambre d'Agriculture du 82 peut fournir des pièges (hors parcelles en confusion sexuelle).

- **Bactérioses** (*Pseudomonas syringae*, *Xanthomonas arboricola*)

La bactérie responsable de la maladie hivernale dans les bourgeons et dans les chancres. Les premières infections commencent au printemps, à la faveur des pluies, dans les 3 semaines qui suivent la chute des pétales.

On observe des criblures en prunier japonais, sur certains vergers de façon importante, sur d'autres de façon plus discrète.

Les pluies et les températures froides des semaines passées ont été favorables aux contaminations bactériennes et engendrent désormais des sorties de symptômes.

Évaluation du risque : Risque fort cette semaine avec les conditions fraîches et humides. Surveiller surtout les variétés sensibles et les parcelles touchées en 2015.

- **Cochenilles lécanines** - Voir paragraphe « toutes espèces à noyaux »

- **Monilioses** (*monilia fructicola*, *monilia fructigena*, *monilia laxa*) : voir paragraphe « toutes espèces »

PÊCHER

- **Pucerons** (*Myzus persicae*)

Le puceron vert du pêcher hiverne, comme le puceron vert du prunier, sous forme d'œufs d'hiver. Les femelles fondatrices, issues de ces œufs d'hiver, donnent des colonies de pucerons (virginipares aptères) aptes à se reproduire très rapidement. Le puceron vert du pêcher peut également véhiculer des viroses.

En verger traités, la situation reste propre et les températures fraîches sont moins favorables aux pucerons.

Évaluation du risque : La période de risque est en cours. A surveiller. Il existe un risque si seulement si les foyers sont évolutifs.

- **Tordeuse orientale** - Voir paragraphe « toutes espèces »

- **Monilioses** (*monilia fructicola*, *monilia fructigena*, *monilia laxa*) : voir paragraphe « toutes espèces »

CERISIER

- **Stade phénologique :** Récolte de Summit cette semaine.

- **Puceron noir** (*Myzus cerasi*)

Le puceron noir du cerisier hiverne sous forme d'œufs d'hiver. Les femelles fondatrices aptères issues de ces œufs vont constituer au printemps des colonies aptes à se reproduire rapidement.

On observe quelques petits foyers, mais sans grande incidence à ce jour. Le feuillage reste globalement propre.

Évaluation du risque : A surveiller. La période de risque est en cours.

• ***Drosophila suzukii***



Adultes de Drosophila Suzukii
Photo CA 82)

Éléments de biologie :

- Diptère de la famille des Drosophilidae, ce ravageur s'attaque particulièrement aux cerisiers, petits fruits rouges et fraisiers. Les dégâts peuvent parfois être confondus avec ceux de la mouche de la cerise. La drosophile est cependant bien plus petite que la mouche de la cerise et peut pondre plusieurs fois dans le même fruit.
- Ce parasite a été détecté depuis 2010 dans le Tarn-et-Garonne. Il a causé des dégâts importants en cerisier en 2013 et 2014, moins en 2015.

Les captures de *Drosophila suzukii* sont toujours très importantes dans les vergers.

Des dégâts très importants sont observés en parcelles non traitées (80% ou plus) depuis quelques semaines et plus récemment également sur des fin de cueille ou des parcelles peu traitées. Ce qui confirme la très forte pression de l'année.

En parcelles traitées rigoureusement, dans la majorité des cas la pression reste encore plutôt maîtrisée et les dégâts restent faibles (inférieurs à 10% en moyenne, légère remontée cette semaine).

Évaluation du risque : Risque très fort en cours. Inoculum très important cette année.

📌 Méthodes alternatives : Les filets insect-proof sont très efficaces contre *Drosophila suzukii*.

- **Monilioses** (*monilia fructicola*, *monilia fructigena*, *monilia laxa*) : voir paragraphe « toutes espèces »

TOUTES ESPÈCES

• **Tordeuse orientale** (*Cydia molesta*)

La tordeuse orientale hiverne sous forme de chenilles diapausantes dans l'écorce du tronc ou dans le sol. Les papillons de la première génération sortent de mi-mars à mi-juin selon les régions. Après l'accouplement, les femelles pondent sur la face inférieure des feuilles, si la température crépusculaire dépasse 16°C.

Le premier vol s'est déroulé dans des conditions peu favorables à l'activité du ravageur.

Nous n'observons encore aucun symptôme sur pousse en verger de prunier ou de pêcher conventionnels, seulement quelques dégâts en verger bio.

x Données de la modélisation : le modèle a été initialisé au 28 mars 2016

Selon le modèle DGAL, la G2 est en cours :

- Nous serions actuellement à 68% du vol, 30% des pontes et 3% des éclosions de la G2
- La période d'intensification des pontes devraient durer jusqu'au 24 juin.
- La période d'intensification des éclosions devrait démarrer le 20 juin et durer jusqu'au 28 juin.

Évaluation du risque : Début de la G2. Les éclosions démarrent et devraient s'intensifier entre le 20 juin (20%) et le 28 juin (80%).

• **Pou de San José** (*Diaspidiotus perniciosus*)

Présente essentiellement sur pommier et poirier, cette cochenille est difficile à observer sur bois du fait de la couleur sombre (gris/noir) des boucliers. C'est généralement la présence sur fruit qui alerte les producteurs sur la présence de l'insecte.

Le premier essaimage se termine.

Évaluation du risque : A surveiller

■ **Seuil de nuisibilité** : dès présence.

• **Cochenilles lécanines** (*Parthenolecanium corni*)

Cette cochenille est essentiellement observée sur prunier japonais. Les adultes ont commencé à pondre sous les boucliers avec des quantités d'œufs importantes. Il faut compter 15 à 30 jours entre le début des pontes et la sortie des premières larves mobiles.

Évaluation du risque : Début de sortie des larves mobiles. Surveiller l'évolution des stades à la parcelle. La période de risque débute. Le risque sera maximal la semaine prochaine.



Boucliers femelles et œufs
Photo CA82

• **Monilioses** (*Monilia fructicola*, *Monilia fructigena*, *Monilia laxa*)

Les monilioses sont les principales maladies affectant la conservation des fruits à noyau. Elles sont provoquées par 3 espèces de champignons :

- *Monilia fructigena* (sur fruits),
- *Monilia laxa* et *Monilia fructicola* (sur fleurs et sur fruits).

Les fruits sont sensibles aux monilioses à l'approche de la maturité. Certaines variétés sont particulièrement sensibles : Summit, Van, Lapins...

On observe des dégâts régulier en cerisier et quelques dégâts plus faibles en prunier japonais et en pêcher.

Évaluation du risque : La période de risque est en cours sur le cerisier et sur les variétés précoces de pêcher et de prunier japonais. Le risque est accentué par les conditions climatiques humides prévues toute la semaine et en cerisier par des éclatements conséquents en verger.

REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par les animateurs filière arboriculture de la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et élaboré sur la base des observations réalisées par le CEFEL, la FREDON Engineering, la Chambre d'agriculture du Tarn-et-Garonne et QUALISOL.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.