

### A retenir



Abonnez vous aux  
éditions Midi-Pyrénées  
du BSV

[www.bsv.mp.chambagri.fr](http://www.bsv.mp.chambagri.fr)

#### MILDIU

Attention, le risque reste fort.

#### BLACK-ROT

De nouveaux symptômes apparaissent. Observez attentivement vos grappes.

#### CICADELLE VERTE







Les populations augmentent. Surveillez l'évolution des effectifs.

#### VERS DE GRAPPE

Début de troisième vol imminent. Pensez à renouveler vos capsules et surveiller vos pièges

## MÉTÉO

### Prévisions du 3 au 8 août 2016

	Mer 3	Jeu 4	Ven 5	Sam 6	Dim 7	Lun 8
Températures	16 33	18 29	17 26	15 28	16 29	16 31
Tendances						

L'orage survenu dans le courant du week-end dernier a été accompagné de grêle sur le secteur de Nohic. Mais les dégâts sur grappe semblent mineurs.

## STADES PHENOLOGIQUES

Le début de véraison se confirme sur Gamay. Les tous premiers grains vérés sont observés sur Syrah et Négrette. Le démarrage de la véraison reste encore très lent.

La campagne conserve une tendance plutôt « moyenne » en terme de précocité (sur les mêmes bases de que 2014 et 2012).

## ÉTAT GÉNÉRAL DES PARCELLES

A ce stade, et compte-tenu de la progression des différentes maladies fongiques et de la présence de dégâts d'échaudage, il devient parfois difficile d'identifier l'origine des dépérissement observés.

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018.

**ÉCOPHYTO**  
RÉDUIRE ET AMÉLIORER  
L'UTILISATION DES PHYTOS

Directeur de publication :

Denis CARETIER  
Président de la Chambre  
Régionale d'Agriculture  
Languedoc-Roussillon  
Midi-Pyrénées  
BP 22107 - 31321 CASTANET  
TOLOSAN Cx  
Tel 05.61.75.26.00

Dépôt légal : à parution  
ISSN en cours

## NE PAS CONFONDRE :



*Dégâts d'échaudage sur grappes*  
Photos CA31



*Mildiou sur grappe facies "rot brun"*  
Photo CA 82



*Black-rot sur grappe*  
Photo Vivalie

Dans le cas de l'**échaudage**, les dégâts ne sont visibles que sur la face des grappes exposée au soleil. Dans le cas du **rot brun**, les baies présentent des marbrures brunes ou violacées partant du pédicelle ainsi qu'une dépression en « coup de pouce ». Dans le cas du **Black-rot**, les baies commencent à flétrir et des ponctuations noires apparaissent à la surface.

## MILDIOU (*Plasmopara viticola*)

### • Situation au vignoble

Quelques nouvelles taches fraîches sont observées sur jeunes feuilles. Les parcelles déjà atteintes montrent une progression des dégâts sur grappes.

Il devient rare de trouver des parcelles sans taches. Et, les parcelles qui ont été les plus fortement impactées lors des pluies de mi-juin commencent à « décrocher » et l'évolution de la maladie devient difficile à endiguer.

### • Données de la modélisation

- × **Potentiel Système** : Calcul à partir des données radar : Labastide St Pierre, Villemur ; et de stations météo fixes : Fronton et Vacquiers

**Situation de J-7 à J** : Des pluies ont eu lieu sur toute la zone de vendredi 29 à dimanche 31 juillet mais localement les cumuls peuvent être restés faibles (ex : Vacquiers). Ainsi, la pression exercée par le mildiou stagne mais reste forte sur tous les secteurs.

Les pluies 30 juillet ont engendré des contaminations de masse sur tous les secteurs à l'exception de Vacquiers (pluie relevée trop faible). Des contaminations de masse sont également modélisées le 29 juillet mais uniquement sur le secteur de Pompignan (le plus arrosé).

Les taches issues des contaminations de masse des 21-22 juillet devraient être visibles depuis le milieu de la semaine dernière.

**Simulation de J à J+8** : La pression devrait rester forte sur toute la zone.

Sur l'ensemble des secteurs, des contaminations de masse sont toujours modélisées à chaque pluie dès 3 mm. Ces contaminations pourraient être de forte intensité.

Les taches issues des contaminations de masse du 30 juillet devraient être visibles à partir du 4 août.


- × **Milvit** : (station météo de Vacquiers) : Le modèle considère les pluies du 30 juillet comme contaminantes.

**Évaluation du risque** : La succession d'épisodes orageux et fortement pluvieux a maintenu la pression à un niveau élevé pendant toute la saison. Et la période de risque n'est pas encore terminée.

De nouvelles pluies sont annoncées pour la fin de la semaine et pourront être contaminantes. Il convient de rester vigilant car une majorité des parcelles se situe encore en phase de sensibilité des grappes.

Par ailleurs, le risque de repiquage en présence de rosée matinale reste important compte-tenu de la présence très régulière de symptômes au vignoble.

**Mildiou : Synthèse des épisodes contaminants – Calculs au 01/08/2016 pour la zone Fronton**



**Synthèse réalisée à partir des données de Potentiel Système et des suivis de parcelles du réseau de surveillance :**

Les données de la modélisation permettent d'identifier les pluies contaminantes et les suivis en parcelles confirment les dates de sorties de taches.

La contamination de masse et la sortie des taches correspondantes sont identifiées par une couleur et un numéro identiques

La hauteur des histogrammes est proportionnelle à la hauteur de la pluie contaminante  
numéros encadrés = sortie de taches confirmées par les observations sur le réseau de surveillance

## OÏDIUM (*Uncinula necator*)

• **Situation au vignoble :** Les symptômes évoluent peu et on ne note pas de progression des attaques aux parcelles qui étaient restées indemnes jusque-là.

**Évaluation du risque :** Après le stade fin de fermeture, les grappes sont beaucoup moins sensibles à de nouvelles contaminations. Mais si des symptômes sont déjà présents sur grappes, l'évolution de la maladie reste possible d'autant plus si les conditions sont favorables (brumes ou brouillard matinaux notamment).

Un **contrôle rigoureux et régulier du niveau d'atteinte** de vos parcelles s'impose à ce stade. Les contrôles visuels sont à faire sur au moins 50 grappes réparties sur une vingtaine de souches par parcelle. La germination du champignon est gênée par une forte luminosité. Les symptômes doivent donc être recherchés au cœur des souches, à l'abri de la lumière.

**Dans les parcelles indemnes et ayant atteint le stade fermeture complète de grappe :** l'extériorisation de nouveaux symptômes est peu probable et ne devrait pas engendrer de dégâts significatifs sur la vendange.

**Dans les parcelles présentant quelques symptômes sur grappes :** la maladie peut progresser sur les baies à partir de symptômes déjà présents et le risque se maintient jusqu'à la véraison.

① **Mesures prophylactiques :** Le développement du champignon, et notamment la sporulation, est perturbé par la lumière. En assurant l'insolation et l'aération des grappes, l'effeuillage peut permettre de limiter la progression du champignon.

## BLACK ROT (*Guignardia bidwellii*)

- **Situation au vignoble :** Depuis la fin de la semaine dernière on observe une sortie de symptômes significative voire importante, notamment dans les parcelles à historique (sortie également sur autres parcelles mais moins importante). Ces symptômes seraient à relier aux épisodes pluvieux des 10-12 juillet (voire plus tôt), dates auxquelles le stade fermeture n'était pas majoritairement atteint.

A ce jour, même si les grappes ne devraient plus être sensibles à de nouvelles contaminations, l'extériorisation de contaminations plus « anciennes » reste possible.

**Évaluation du risque :** A la véraison, la sensibilité des grappes à de nouvelles contaminations diminue.

En présence significative des taches sur feuilles et grappes ou dans les situations les plus tardives (engagement de la véraison encore lent), il convient de rester vigilant. Ailleurs, le risque devient nul.

Il est primordial d'identifier les situations à risque afin d'y adopter, lors de la prochaine campagne, un suivi spécifique, tenant compte de la présence d'un inoculum important (baies momifiées, rameaux cancrés) et propice au déclenchement précoce de l'épidémie.

## BOTRYTIS (*Botrytis cinerea*)

- **Situation au vignoble :** La survenue régulière de pluies reste favorable au développement du champignon qui reste actif dans les parcelles à risque (notamment les parcelles les plus vigoureuses et les plus « chargées »).

On observe des foyers réguliers en diverses situations.

**Évaluation du risque :** Surveillez attentivement l'évolution de l'état sanitaire de vos parcelles à risque, car la mauvaise chute des capuchons pourrait avoir créé les conditions d'un développement précoce de la maladie.

L'annonce de nouveaux épisodes pluvieux maintient des conditions favorables au développement de la maladie.

**ⓘ Mesures prophylactiques :** Ne négligez pas l'intérêt de la prophylaxie pour limiter le développement du champignon :

- maîtrise de la vigueur,
- aération des grappes et la création d'un microclimat défavorable au champignon,
- limitation des portes d'entrée par une bonne gestion du risque vers de grappe et oïdium.



*Botrytis : début de foyer sur Négrette*  
Photo CA 31

## VERS DE LA GRAPPE (*Lobesia botrana*)

- **Situation au vignoble :** On ne signale pas de captures significatives sur les pièges du réseau de surveillance, à l'exception d'une capture unique sur un piège du secteur de Campsas, qui réagit souvent plus précocement que les autres secteurs du vignoble.



- **Données de la modélisation :** La deuxième génération touche à son terme avec la fin du développement et la nymphose des larves. Le modèle n'identifie pas encore de début de troisième vol, mais celui-ci devrait démarrer d'ici 7 à 8 jours.

Modélisation	G2							
	% Adultes	% œufs	% L1	% L2	% L3	% L4	%L5	% Nymphe
Données au 1 <sup>er</sup> août Zone Fronton								
<b>Vacquiers</b>	100%	100%	100%	97,6%	77,9%	52,4%	21,9 %	0,6 %

**Évaluation du risque :** La deuxième génération se termine. Il est encore trop tôt pour identifier la prochaine période de vol. Anticipez son démarrage en renouvelant les capsules et en surveillant attentivement vos pièges.

La pression en fin G2 apparaît faible dans la majorité des situations (attention car la pression peut être ponctuellement plus élevée). Il est toujours temps d'effectuer vos comptages pour évaluer la pression en fin de génération.

La troisième génération de tordeuse est généralement plus impactante en terme de dégâts et d'altération de la qualité de la vendange. Sa gestion peut être anticipée dans les situations où un dépassement du seuil de nuisibilité peut être observé en fin de G2.

■ **Seuil de nuisibilité fin de G2 :** 10 perforations pour 100 grappes.

📍 **Mesures prophylactiques :** Pensez à réaliser les contrôles de l'efficacité de vos dispositifs de confusion, notamment pour adapter les stratégies de gestion de la fin de la saison. N'attendez pas la véraison qui peut rendre plus difficile l'observation des dégâts.

## CICADELLE VERTE *(Empoasca vitis)*

- **Situation au vignoble :** La progression des populations déjà signalée la semaine dernière se confirme avec des effectifs qui se rapprochent voire dépassant le seuil de nuisibilité.

**Évaluation du risque :** Surveillez vos parcelles. Les observations et les comptages doivent porter sur les populations larvaires qui sont peu mobiles et visibles à la face inférieure des feuilles. Les adultes, qui sont plus facilement visibles car ils volent, ne sont pas la cible des stratégies de gestion.

■ **Seuil de nuisibilité :** 100 larves de cicadelle pour 100 feuilles

📍 **Mesures prophylactiques :** L'application d'argile comme barrière physique est à mettre en place avant l'installation significative des populations.

# CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DORÉE

(*Scaphoideus titanus*)

- **Situation au vignoble** : Les relevés de la semaine dernière confirment que les populations d'adultes sont en pleine progression dans les parcelles de vigne. Les symptômes de la maladie deviennent de plus en plus visibles au vignoble.

**Évaluation du risque** : Éliminer les pieds avec des symptômes de Flavescence dorée dès leur détection et signalez les au moment de la prospection.

**Cas des vignes en conventionnel et des vignes-mères** : pour les situations le nécessitant le T3 adulticide peut être positionné à T2 + 30 jours soit entre le 2 et le 12 août

**Le prochain BSV Vigne Fronton paraîtra le mardi 9 août 2016**

## REPRODUCTION DU BULLETIN AUTORISÉE SEULEMENT DANS SON INTÉGRALITÉ (REPRODUCTION PARTIELLE INTERDITE)

Ce bulletin de santé du végétal a été préparé par l'animateur filière viticulture de la Chambre Régionale d'Agriculture Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées et est élaboré sur la base des observations réalisées par la Chambre d'Agriculture de Haute-Garonne, la Cave de Fronton et les agriculteurs observateurs.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. La CRA Languedoc-Roussillon Midi-Pyrénées dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base des observations qu'ils auront réalisées et en s'appuyant sur les préconisations issues de bulletins techniques.